

Auto aborto con Misoprostol solo antes de 12 semanas de embarazo




1



1 hora antes (recomendado para el dolor) :
2 comprimidos de 400mg Ibuprofeno


2

Luego : 4 comprimidos de 200mcg de misoprostol



Debajo de la lengua
se disuelve

3



cada 3 horas hasta la expulsion
Máximo 3 tomas

Pour augmenter les chances que l'avortement soit complet, il est recommandé de prendre une deuxième dose de misoprostol, même si vous avez déjà commencé à saigner ou si quelque chose a été expulsé après la première dose, surtout si la grossesse est de moins de 9 semaines.



Auto aborto con Misoprostol solo despues de 12 semanas de embarazo




1



1 hora antes (recomendado para el dolor) :
2 comprimidos de 400mg Ibuprofeno


2

Luego : 2 comprimidos de 200mcg de misoprostol



Debajo de la lengua
se disuelve

3



cada 3 horas hasta la expulsion
Máximo 3 tomas

Para aumentar las posibilidades de que el aborto sea completo, se recomienda tomar una segunda dosis de misoprostol, incluso si ya ha comenzado a sangrar o si ha expulsado algo después de la primera dosis, especialmente si el embarazo es de menos de 9 semanas.



AUTO ABORTO CON MISOPROSTOL Y MIFEPRISTONA ANTES DE 12 SEMANAS DE EMBARAZO



1



1 comprimido de Mifepristona (200mg)
🕒 y esperar 24 a 48 horas

2




2 comprimidos de 400mg Ibuprofeno
(recomendado para el dolor)

1 hora después

3

**4 comprimidos de
200mcg de misoprostol**



Cada 3 horas hasta la expulsión – Máximo 3 tomas

Para aumentar las posibilidades de que el aborto sea completo, se recomienda tomar una segunda dosis de misoprostol, incluso si ya ha comenzado a sangrar o si ha expulsado algo después de la primera dosis, especialmente si el embarazo es de menos de 9 semanas.



AUTO ABORTO CON MISOPROSTOL Y MIFEPRISTONA DESPUES DE 12 SEMANAS DE EMBARAZO



1



1 comprimido de Mifepristona (200mg)
y esperar 24 a 48 horas

2




2 comprimidos de 400mg Ibuprofeno
(recomendado para el dolor)

1 hora despues

3

**2 comprimidos de
200mcg de misoprostol**



Debajo de la lengua
se disuelve en 30mn

Cada 3 horas hasta la expulsion – Máximo 3 tomas



Para aumentar las posibilidades de que el aborto sea completo, se recomienda tomar una segunda dosis de misoprostol, incluso si ya ha comenzado a sangrar o si ha expulsado algo después de la primera dosis, especialmente si el embarazo es de menos de 9 semanas.



SEÑALES DE PELIGRO Y COMO REACCIONAR



ACUDA AL CENTRO DE SALUD O AL HOSPITAL MAS CERCANO SI:



Sangrado abundante por la vagina:

- sangrado que empapa en una hora dos toallas higiénicas o protectores de tela para menstruaciones normales y que se repite en la hora siguiente
- sangrado acompañado de mareos o vértigos



Pérdidas malolientes de color verdoso o amarillento procedentes de la vagina



Coágulos de sangre más grandes que una naranja



Dolores intensos y permanentes en el abdomen que empeoran a pesar de tomar analgésicos



Fiebre superior a 38 °C que comienza dentro de las 24 horas siguientes a la toma del misoprostol

Si no desea decir que ha tomado medicamentos para interrumpir un embarazo: simplemente puede indicar que tiene sangrado. El personal médico no puede distinguir entre un aborto espontáneo natural o una interrupción medicamentosa.